

1. ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบป้องกันและดูแลมารดาตกเลือดหลังคลอด
2. ชื่อหน่วยงาน : งานห้องคลอด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
3. คำสำคัญ : มารดาตกเลือดหลังคลอด
4. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : ภาวะตกเลือดหลังคลอด เป็นปัญหาที่สำคัญของงานห้องคลอด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย พบเป็นภาวะแทรกซ้อนอันดับหนึ่งของมารดาหลังคลอดและเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติการณ์มารดาเสียชีวิตได้ ผลการดำเนินงานปี 2560 - 2563 พบร้อยละมารดาตกเลือดหลังคลอด เท่ากับร้อยละ 4.02, 3.59, 1.61, 1.73 และ 1.56 ตามลำดับ เกิดภาวะ shock ร้อยละ 5.56, 17.65, 33.33 และ 20 ตามลำดับ ปี 2561 พบความเสี่ยงระดับ 1 (มารดาเสียชีวิตจากการตกเลือดหลังคลอด) จำนวน 1 ราย คิดเป็นอัตรา 211.42 หน่วยงานมีการทบทวนวิเคราะห์หาสาเหตุโดยรวมได้ดังนี้
 - 1) มดลูกหดรัดตัวไม่ดีร้อยละ 51.85
 - 2) จากรกค้างร้อยละ 24.08
 - 3) เกิด Hematoma จากแผลฝีเย็บร้อยละ 11.11
 - 4) ปากมดลูกฉีกขาดจากทารกตัวโต จากการใช้สูติศาสตร์หัตถการช่วยคลอด ร้อยละ 9.26 และ
 - 5) พบภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดคลอด (Tear lower uterine segment) ร้อยละ 3.70 จากการทบทวนปัญหาที่พบมีประเด็นสำคัญคือ สมรรถนะของพยาบาลในห้องคลอดแตกต่างกัน เช่น การประเมินภาวะเสี่ยง Uterine atony ในแต่ละระยะของการคลอด, การตัดสินใจเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินในการออกเหตุรับมารดาคลอดนอกโรงพยาบาล, เทคนิคการทำคลอดรก และการเย็บซ่อมแซมแผลที่ฉีก นอกจากนี้ยังพบว่าการคัดกรองและแก้ไขภาวะเสี่ยงได้ตั้งแต่ฝากครรภ์ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดได้มาก และจากการทบทวนยังพบว่าแนวทางการให้ยาเพื่อให้มดลูกหดรัดตัวดีตาม CPG ทำได้ล่าช้า ไม่เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล ทำให้การรักษาภาวะ Uterine atony ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการตกเลือดในมารดาหลังคลอด ทำได้ล่าช้าตามมา

เขียนโดย Administrator

วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2022 เวลา 15:45 น. - แก้ไขล่าสุด วันอังคารที่ 10 มกราคม 2023 เวลา 11:34 น.
